Peut-on rêver d'une unité de dialyse sans cathéter ?

Dr Jean Ethier

CHUM

OBJECTIFS

- Discuter des statistiques sur l'utilisation des différents accès vasculaires au niveau international, national et provincial
- Expliquer les raisons pour lesquelles les patients hésitent à choisir la fistule AV native comme accès vasculaire
- Discuter du moment idéal pour offrir la fistule à un patient afin d'augmenter les chances de succès
- Discuter de la place du greffon au sein du choix des accès vasculaires
- Discuter des outils utiles à la prise de décision quant au moment et au type d'accès vasculaire à offrir
- Discuter d'un éventuel registre des accès vasculaires au Québec

Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS)

- Étude internationale d'observation longitudinale de patients hémodialysés et des modes de pratique dans les unités de dialyse
- Données internationales recueillies de façon uniforme
- Sélection randomisée d'unités de dialyse avec une représentativité nationale
- **BUT:** Amélioré la longévité des patients hémodialysés en identifiant les modes de pratique associés à une amélioration du devenir des patients
- **CRITÈRES DE JUGEMENT:** Mortalité, hospitalisation, les abords vasculaires et la qualité de vie
- Supporté par des subventions sans restriction d' Amgen, Kyowa Hakko Kirin, Abbot, Sanofi, Vifor Fresenius, Baxter, Medical Care Renal PharmaKirin Brewery, Ltd.
- Coordination de l'étude faite par l' University Renal Research & Education Association (URREA), Ann Arbor, MI USA

DOPPS 2 à 4

DOPPS Program Worldwide

DOPPS – PDOPPS – CKDopps

Participation in DOPPS

Study Phase	Years	Countries	Facilities	Patients
DOPPS 1	1996-2001	7	308	17,034
DOPPS 2	2002-2004	12	322	12,839
DOPPS 3	2005-2008	12	300	11,170
DOPPS 4	2009-2011	12	380	15,528
DOPPS 5	2012-2015	21*	~505	~18,500

DOPPS 1: France, Germany, Italy, Japan, Spain, UK, and US

DOPPS 2-4: DOPPS 1 countries plus Australia/New Zealand, Belgium, Canada, Sweden

DOPPS 5: DOPPS 4 countries plus China, GCC-6 (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates), Russia, Turkey

* The *DOPPSLite* protocol, with annual cross-sections and limited longitudinal data, will be used in nine countries (Belgium, China, GCC-6, and Sweden)

Données du problème

ABORD VASCULAIRE IDÉAL

- Débit sanguin suffisant pour une dialyse adéquate
- Fiable
- Perméabilité de longue durée
- Faible taux de complications
- Offre la meilleure survie
- Doit aussi « être profitable » à un patient donné
 - Préserve un état de bien-être, sans hospitalisation
 - Bonne qualité de vie; permet au patient de vivre leur vie selon leur standard et leur contexte de vie

Mortalité par type d'abord vasculaire

Risque de mortalité par type d'abord vasculaire

RR of death per 20% greater use of access type

- 1996-2004; n=27,892; adjusted for age, gender, race, vintage, 14 comorbidities, wt, facility median treatment time, facility % serum Ca >10 mg/dl, facility % serum PO₄ >5.5 mg/dl.
- **Fistulas were also associated with significantly lower risks of hospitalization and hospitalization for infection**

Higher Facility Catheter Use Associated with Higher Risk of Infection-related Hospitalization

Facility Catheter Use (%)

9 - 13

13 - 18

18 - 28

28 +

Infection-Related Hospitalization

RR=1.33 (p=0.008) per 20% Higher Facility Catheter Use

1.07

1.03

1.28

1.56

9 - 13

13 - 18

18 - 28

28 +

Vascular Access Infection-Related Hospitalization

RR=1.79 (p<0.0001) per 20% Higher Facility Catheter Use

1.24

1.18

1.64

2.56

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Relative Risk (95% CI)

Reference:
Facility Case-mix Adjusted
Catheter Use <9%

*DOPPS 1+2, 1996-2004; n=27,401; adjusted for age, gender, black race, yrs with ESRD, 14 comorbidity classes, weight, baseline Kt/V, serum calcium, serum PO₄, whether hosp unit, & accounted for facility clustering effects; stratified by study phase & region. Facility access use (%) adjusted for facility case-mix.

Abords vasculaires: Risque d'infection et de procédure

1996-2004. Adjusted for age, sex, smoking, 14 comorbid diseases

Taux de bactériémie par type d'abord vasculaire et la relation avec le % d'utilisation de cathéter par pays

■ Cath bact rate ■ AVF bact rate ■ AVG bact rate
■ Non-VA bact rate ◆ % cath use

Choix Abords

➔ Durant la première année de dialyse

All costs reported in 2009 Canadian dollars (1 CAD = 0.82 USD)

Abbreviations: tPA=tissue Plasminogen Activator, AVF=Arteriovenous Fistula, AVG=Arteriovenous graft, CVC=Central Venous Catheter

* Comparison of costs using Kruskal-Wallis test

** Comparison of log transformed costs using one-way ANOVA

James, M. T., Manns, B. J., Hemmelgarn, B. R., Ravani, P. & Alberta Kidney Disease Network What's next after fistula first: is an arteriovenous graft or central venous catheter preferable when an arteriovenous fistula is not possible? Seminars in Dialysis 22, 539–544 (2009).

RÉSUMÉ

- Pas d'étude RC sur les abords vasculaires
- Dans les études d'observation:
 - La fistule AV native apparaît être l'abord vasculaire de choix tant pour la survie que les complications
 - Le FAV avec greffon (PTFE) semble plus avantageux que le cathéter pour la survie et les complications
 - Les greffons semblent plus coûteux que les cathéters

ÉTAT ACTUEL

Type d'abord vasculaire, par pays

–Patients prévalents, DOPPS 5 (2013-2014) –

% of patients

■ Catheter

■ AV-Graft

■ AV-Fistula

N pts:

Modification des tendances par pays

% of patients

■ Catheter ■ AV-Graft ■ AV-Fistula

Prevalent cross-sections, DOPPS 2 (2002-2004), DOPPS 3 (2005-2008), DOPPS 4 (2009-2011); DOPPS 5 (August 2013)

Abords vasculaires à l'entrée dans l'étude*

– Chez les pts en dialyse depuis ≤ 60 days –

Patients (%)

N Pts:

Pourcentage de patients prévalents par type d'abord vasculaire, au Canada, 2001-2010

Source: Canadian Organ Replacement Register, 2012, Canadian Institute for Health Information

Pourcentage de patients incidents par type d'abord vasculaire, au Canada, 2001-2010

Source: Canadian Organ Replacement Register, 2012, Canadian Institute for Health Information

Type d'abord prévalent par province en 2010

Percentage of patients using each type of vascular access by Canadian province. AB=Alberta; BC=British Columbia; MB=Manitoba; NB=New Brunswick; NL=Newfoundland; NS=Nova Scotia; ON=Ontario; QC=Quebec; SK=Saskatchewan
 Source: CORR 2010

RÉSUMÉ

TROP DE CATHÉTERS

FACTEURS ASSOCIÉS

- Facteurs liés au patient
- Soins pré-dialyse
- Facteurs liés à la disponibilité et l'expertise de l'équipe chirurgicale
- Préférences des patients
- Attitudes des néphrologues

Caractéristiques des patients avec cathéters

- Les facteurs associés avec le « risque » d'être dialysé par cathéter sont:
 - Âge
 - Femme
 - « Référence » tardive
 - Diabète
 - MVAS ou MCAS ou les deux
 - IMC ?

Distribution des types d'abord vasculaire par groupe d'âge

Prevalent cross-sections of patients on dialysis >90 days at time of study entry; DOPPS 1(1996-2001), DOPPS 2 (2002-2004), DOPPS 3 (2005-2008), DOPPS 4 (2009-2011)

Casuistique, par région

– DOPPS 5 (2012-2014) –

Characteristic	N. America	Japan	Europe
Coronary artery disease	40%	25%	33%
Cancer	15%	11%	16%
Cardiovascular, other	25%	22%	28%
Cerebrovascular	15%	12%	15%
CHF	28%	16%	17%
Diabetes	58%	37%	35%
GI bleed	5%	4%	4%
HIV/AIDS	0%	0%	1%
Hypertension	92%	79%	86%
Lung disease	17%	4%	12%
Neurologic disease	10%	7%	10%
Psychological disorder	22%	4%	15%
Peripheral vascular disease	28%	14%	27%
Cellulitis	10%	3%	8%
	N=3,776	N=1,625	N=2,972

Caractéristiques des patients avec KT

- Échec de création d' une fistule AV ou d' un greffon
- Absence ou perte du capital vasculaire pour la création d' une fistule AV
- Maladie vasculaire
- Espérance de vie ou la « fragilité » du patient

PRÉ-DIALYSE

Délai entre la première visite en néphrologie et le début de la dialyse*

Patients (%)

N Pts:

* DOPPS 5 (2012-14); among patients enrolled in the DOPPS within 120 days of starting dialysis

Abord vasculaire AV créé avant l'IRT*

Chez les patients avec > 4 mois de soins pré-dialyse

Patients (%)

* DOPPS 5 (2012-14); among patients enrolled in the DOPPS within 120 days of starting dialysis

Différences importantes dans le DFGe immédiatement avant le début de la dialyse

eGFR* immediately before dialysis

* Calculated using the MDRD 4 variable equation; Median eGFR at start in Japan is similar to JSDT data (6.5 ml/min/1.73m² in Yamagata et al, 2011); Country differences remained after adjusting for age, gender, comorbidities, and accounting for facility clustering

Associations avec l'utilisation d'un abord AV à l'initiation de la dialyse

Variable	Rapport de cotes Non ajusté (95% CI)	Rapport de cotes ajusté ^a (95% CI)
DFGe à l'initiation de la dialyse (par 2.5 mL/min plus bas)	1.14(1.05,1.24)*	1.13(1.00,1.28)*
Fréquence des visites en pré-dialyse ^b		
0 visites	0.62(0.34,1.13)	0.33(0.15,0.74)*
1 visite	1.00(ref)	1.00(ref)
2-4 visites	2.42(1.43,4.07)*	2.54(1.31,4.94)*
5+ visites	4.03(2.30,7.06)*	4.39(2.19,8.82)*

a. Adjusted for listed variables plus age, vintage, country and US-black race, 12 summary comorbid conditions, and facility clustering; Among patients on dialysis < 120 days at DOPPS enrollment; For patients missing data on access at dialysis start (42%), access at DOPPS enrollment was used (median [interquartile range] of days on dialysis at DOPPS enrollment was 69 [36-93] days for these patients)

b. Number of visits in the year before starting dialysis

* p < 0.05

CHIRURGIE

The Importance of Surgical Resources

Access Surgeons

of Days

% of surgery time spent performing vascular access-related surgery

Hours per week spent performing vascular access-related surgery

Facility size (11 151 HD patients)

No. of weekly hours of vascular access-related surgery per facility size

Country (n)	% of surgery time spent performing vascular access-related surgery		Hours per week spent performing vascular access-related surgery		Facility size (11 151 HD patients)		Median
	Mean	Median	Mean	Median	Mean	Median	
Canada (16)	30%	18%	5	4	137	131	0.027
EU (92)	40%	25%	5.5	4	68*	64	0.059
USA (42)	35%	31%	9.2**	6	90*	78	0.082

Délai jusqu'à l'échec d'une première fistule AV en fonction du nombre d'abord vasculaires créé par le chirurgien durant sa formation

* Adjusted for age, sex, race, vintage, 14 comorbidities, prior catheter use, country

Préférences des patients

PRÉFÉRENCES DU PATIENT DONNÉES ANTÉRIEURES

- Les facteurs associés à une préférence pour les cathéters sont:
 - Âge (AOR de 1,14 par 10ans, IC 95% = 1,02-1,26)
 - Sexe féminin (AOR de 1,49, IC 95% = 1,15-1,93)
 - Emploi antérieur de KT (AOR= 2,61, IC 95%=1,66-4,12)
 - Emploi actuel de KT (AOR=60,3, IC 95%=36,5-99,8)
- Varie selon les pays mais fortement lié à l'utilisation de KT
- Suggère que les préférences des patients peuvent être modifiées par des facteurs socio-culturels et en relation avec l'utilisation des KT dans l'unité
- Une façon d'influencer ces préférences est d'éviter autant que possible l'utilisation des KT

Préférences pour le type d'abord telles que rapportées par les patients et par pays

— DOPPS 4: Nouveaux résultats —

Patients (%)

N Pts:

Préférences pour le type d'abord telles que rapportées par les patients et par pays

– DOPPS 4, Chez les patients avec un cathéter –

Patients (%)

N Pts:

Préférence des Patients

Characteristic	Overall (n=3815)	Prefer Catheter (n=505)	Prefer AV Fistula or Graft (n=3310)
History of catheter use, %			
No history of catheter use	50.6	7.6	57.4
Former catheter use	35.1	20.5	37.4
Current catheter use	14.3	71.8	5.2

Fissell, R.B. et al, J Vasc Access, 2013

Préférences pour les types d'accès au CANADA

Principales Raisons des patients pour Préférer un Cathéter

– Chez les patients préférant un cathéter–

Raison de la préférence	% des réponses*
Pas de ponction avec de grosses aiguilles	57%
Pas de saignement après la dialyse	38%
Ne nécessite pas une grosse chirurgie à l'installation	18%
Pas de changement corporel permanent	16%
Autres	17%

* Multiple responses allowed; among 799 patients who preferred a catheter; distribution of responses was similar for n=622 patients currently using a catheter

Opinions des patients sur le type d'abord le plus susceptible d'être la source d'infection

– DOPPS 4 –

Patients (%)

N Pts:

Opinions des patients sur le type d'abord ayant la durée de vie la plus longue

– DOPPS 4 –

Patients (%)

N Pts:

Résumé

- Il persiste encore de grandes variations entre les pays concernant les préférences des patients pour le type d'abord vasculaire
 - La préférence pour un cathéter (vs une fistule) est plus grande chez les patients qui ont déjà un cathéter
- Les 2 principales raisons de préférer un KT sont :
 - L'absence de ponction avec de grosses aiguilles
 - L'absence de saignement après les dialyses
- Dans plusieurs pays, de 35 à 50% de tous les pts et de ceux avec cathéter ne savent pas quel type d'accès est associé avec le plus haut risque d'infection
- **MESSAGES CLÉS (de la perspective des pts):**
 - Améliorer l'éducation des patients en regard des bénéfices et des risques des différents types d'abord vasculaire
 - Modifier les méthodes de cannulation pour réduire la douleur

Raisons du refus

- 3 principaux thèmes
 - Impact d'expériences antérieures personnelles ou d'autrui
 - Échec de maturation
 - Cannulations douloureuses
 - Saignements
 - Image corporelle
 - Transfert des connaissances et prise de décision éclairée
 - Des professionnels de la santé
 - De leurs pairs
 - Perception d'un manque de connaissance
 - Acceptation du *statut quo*
 - Limitations du mode de vie
 - Absence de complication ou de complication prévue
 - Complications liées à la création des fistules
 - Emphase mise sur le présent, «au jour le jour»

Bonne évaluation de la faisabilité
Expertise dans les ponctions
Bien adressé les saignements

Maximiser la
compréhension des enjeux

Créer les FAV avant
le début des dialyses

Connaissances

	Rapport de cote (IC 95%) d'avoir une FAV n ou g vs cathéter		
	Temps 0	3 mois	6 mois
Connaissances en soins de dialyse Pointage CHeKS par 20 points	1,34 (1,02-1,76)	1,49 (1,16-1,93)	1,33 (1,03-1,72)

Cavanaugh KL, Wingard RL, Hakim RM, Elasy TA, Ikizler TA. Patient Dialysis Knowledge Is Associated with Permanent Arteriovenous Access Use in Chronic Hemodialysis. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. 2009;4(5):950–956.

ATTITUDES DES NÉPHROLOGUES

Table 1. Characteristics of the two patient scenarios presented in the survey

	Patient A	Patient B
Similarities	Caucasian <u>Progressive stage 5 (eGFR 15 ml/min) CKD</u> Not eligible for peritoneal dialysis Medications: 4 antihypertensive agents, phosphate binders, vitamin D and a diuretic	
Differences	<u>Palpable radial and ulnar pulse</u> CKD secondary to polycystic kidney disease No history of diabetes, coronary artery disease, peripheral vascular disease Functions independently No additional medications	CKD secondary to diabetes History of coronary artery disease, peripheral vascular disease Functions with help of family Additional medications: erythropoietin (EPO), acetylsalicylic acid (ASA) and a statin

Table 2. Demographics of nephrologists completing the survey

Nephrologists' characteristics	Percent % (<i>N</i> = 148)
Country of origin	
Canada	50
USA	50
Age (years)	
<35	20
35–65	73
>65	3
Not available	4
Hospital affiliation	
University-affiliated hospital	68
Metropolitan (community-based hospital)	14
Regional/rural (hospital)	10
Private hospital	3
Years in practice	
<6	32
6–10	20
11–20	26
>20	22

Attitudes des néphrologues N-A

Quand et comment référer les patients pour leur abord

a) Minimal comorbidities (Patient A)

b) Multiple comorbidities (Patient B)

Attitudes – Type d'abord demandé

APRÈS 1 ÉCHEC DE FAV à l'avant bras

Barrières à la création de FAV

Fig. 4. Perceived barriers to establishing a mature fistula by Canadian ($n = 69$) and American ($n = 54$) nephrologists. Percentages are indicated immediately to the right of bars.

Contre-Indications

Fig. 5. Absolute contraindications for referral for a permanent vascular access (fistula or graft) as selected by Canadian ($n = 74$) and American ($n = 54$) nephrologists. Percentages are indicated immediately to the right of bars. PD, peritoneal dialysis; HD, haemodialysis; CKD, chronic kidney disease.

**Avantages à convertir les KT
en fistule ?**

Conversion

DOPPS 1 et 2

Rapport de risque instantané de mortalité	
KT vers FAV	0,64 (0,47-0,87)
KT vers Greffon	0,71 (0,55-0,92)
FAV/Gr vs Kt	1,81 (1,22-2,68)

Bradbury BD, et al. Conversion of Vascular Access Type Among Incident Hemodialysis Patients: Description and Association With Mortality YAJKD. 2009;53(5):804–814. doi:10.1053/j.ajkd.2008.11.031.

HEMO

Rapport de risque instantané de mortalité	
Cathéter	2,61 (1,79-3,82)
FAV vers KT	2,38 (1,48-2,86)
KT vers FAV	1,08 (0,60-1,95)

Allon M, et al.. Effect of Change in Vascular Access on Patient Mortality in Hemodialysis Patients. American Journal of Kidney Diseases. 2006;47(3): 469–477

Conversion

- Perception de l'état de santé/qualité de vie
 - Meilleures si fistule AV dès le départ
 - Pas beaucoup de différence en greffon et KT
 - Les patients avec KT et conversion à une FAV ou greffon ont une perception moins favorable des soins reçus en dialyse

1. Wasse H, Kutner N, Zhang R, Huang Y. Association of Initial Hemodialysis Vascular Access with Patient-Reported Health Status and Quality of Life. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. 2007;2(4):708-714. doi:10.2215/CJN.00170107.

ÉVITER LES KT: Survie des fistules AV est plus courte si elle est précédée d'un cathéter

	Échec primaire de FAV			Echec de FAV		
	HR	95% CI	P	HR	95% CI	P
ATCD de KT (vs. non)	1.38	1.11-1.72	0.003	1.49	1.06-2.09	0.02

DOPPS 2 and 3 (2002-2008); Primary failure=time to first failure

Asano et al, Nephron Clin Pract 2013;124:23-30

PAS d'ATCD de KT

ATCD de KT

Pisoni et al KI (2002)

OPTIMISER LA CRÉATION EN PRÉ-DIALYSE

OPTIMISER

- Éducation des patients
 - Avantages, désavantages et risques
 - Nombre de chirurgie
- Le faire en temps opportun
 - DFGe et progression
 - Espérance de vie et « fragilité »
 - Risque du besoin de dialyse
 - Préférences du patient
 - Moment de l'initiation des traitements
 - Éligibilité à FAV/greffon et le risque de complication
- Patient indécis
- Collaboration de la chirurgie

Perméabilité des FAV natives

- Études 2000-2012, 100 pts et + (46 études)
 - Échec primaire:
 - Environ 23% (IC 18-28%)
 - Perméabilité primaire:
 - 60% à 1 an et 51% à 2 ans
 - Perméabilité secondaire:
 - 71% à 1 an et 64% à 2 ans

**Dans un monde idéal ...
QUAND?**

Quand créer une FAVn

- Au moins 3 à 4 mois (6 mois KDOQI) avant utilisation
 - Contrôle de la TA à 130/85 = dim. GFR 2 ml/min/an
 - Contrôle de la TA à 140/90 = dim. GFR 6-8 ml/min/an } 5 ml/min/an
 - Si GFR pour débiter = 6-12 ml/min
- FISTULE À CRÉER LORSQUE GFR de 15-20 ml/min (SCN)
- ÉDUCATION À DÉBUTER À 30 ml/min
 - Choix de la modalité à 20 ml/min
- Référer en chirurgie lorsque DFGe < 20-25 ml/min (Soc Vasc Surgeon 2008)

Sidawy, A. N. et al. The Society for Vascular Surgery: clinical practice guidelines for the surgical placement and maintenance of arteriovenous hemodialysis access. J Vasc Surg 48, 2S–25S (2008)

Quand créer une FAVn

- Débuter la planification du traitement de l'IRT lorsque le risque de cette condition est de 20% à 1 an ou 40% à 2 ans
- **KIDNEY FAILURE RISK EQUATION (Qx Calculate)**
 - Modèle à 8 variables
 - Âge, sexe
 - DFGe et ACR
 - Ca, Pi, HCO₃, alb

Tangri N, et al. A Predictive Model for Progression of Chronic Kidney Disease to Kidney Failure. JAMA : the journal of the American Medical Association. 2011;305(15):1553–1559.

Quand créer l'accès

- Greffon :
 - 6 à 8 sem (3 à 6 sem KDOQI) avant la dialyse
 - À créer lorsque GFR de 8-13 ml/min

QUEL TYPE D'ABORD ?

Types

- But:
 - Éviter chez le plus grand nombre de patients les cathéters
 - Favoriser fistule AV > greffon
- Comment ?
 - Cartographie artérielle et veineuse essentielle
 - Utiliser une équation pour évaluer le risque d'échec de maturation des FAVn
 - Favoriser un greffon en premier lieu ?

Calcul du risque

Variable		Points
ÂGE	≥ 65 ANS	2
MVAS	Documenté	3
MCAS	Documenté	2,5
Race BI		-3
BASE		3
Total		0 à 10,5

Score	Interprétation	Risque d'échec de maturation
< 2	Faible	25%
2-3	Modéré	50%
3,1 -7,9	Haut risque	50%
≥ 8	Très haut risque	70%

Lok CE, Allon M, Moist L, Oliver MJ, Shah H, Zimmerman D. Risk equation determining unsuccessful cannulation events and failure to maturation in arteriovenous fistulas (REDUCE FTM I). *J Am Soc Nephrol.* 2006;17(11):3204-3212. doi:10.1681/ASN.2006030190.

MAIS ...

TRAJECTOIRES

5,606 dialysés, trajectoire du DFGe ds les 2 ans avant HD

O'Hare AM, Batten A, Burrows NR, et al. Trajectories of kidney function decline in the 2 years before initiation of long-term dialysis. *Am J Kidney Dis.* 2012;59(4):513–522.

O'Hare AM, Batten A, Burrows NR, et al. Trajectories of kidney function decline in the 2 years before initiation of long-term dialysis. *Am J Kidney Dis.* 2012;59(4):513–522. doi:10.1053/j.ajkd.2011.11.044.

Quand ?

- (10) We recommend that future CSN policy consider setting specific targets for tasks during CKD Stages 3, 4, and 5 management according to the rate of decline of eGFR:
- (a) Assuming a usual rate of decline of 2–5 ml/minute/year, modality education should usually begin at eGFR = 30 ml/minute, modality decisions should usually be finalized by eGFR = 20 ml/minute, and that those who choose HD (and who are expected to survive long enough and are suitable), should usually be referred to a vascular surgeon for consideration/evaluation of AVF when eGFR = 15–20 ml/minute (as per 2006 CSN guideline).
 - (b) In patients whose rate of decline of eGFR over time is greater than 5 ml/minute/year, these tasks should be undertaken earlier than proposed before.
 - (c) In elderly (and other stable) patients with non-progressive CKD who are not expected to need to initiate HD, these task targets may or may not be relevant.
-

Le patient âgé ?

- Risques compétitifs
 - Décès avant le début de la dialyse ?
 - Survie en dialyse ?
 - Temps ad complications de l'abord vasculaire
- Priorités différentes
 - Indépendance plus importante que la survie

O'Hare AM. Vascular Access for Hemodialysis in Older Adults: A "Patient First" Approach. *Journal of the American Society of Nephrology*. 2013;24(8):1187-1190. doi:10.1681/ASN.2013050507.

Quand ?

11290 vétérans

DFGe < 25 ml/min/1,73 m²

(M = 17,7)

25% ont débuté la dialyse à 1 an

Slit 39% avec un abord

Proportion assez similaire
par groupe d'âge

ALORS IL FAUT RÉFÉRER + TÔT

Si tous les pts référés pour abord à
l'entrée, le ratio abords

non nécessaires/nécessaires à 2 ans

5:1 pour les 85-100 ans

0,5:1 pour les 18-44 ans

Figure 2 | One year outcomes by age group.

O'Hare, A. M. et al. When to refer patients with chronic kidney disease for vascular access surgery: Should age be a consideration? Kidney Int 71, 555–561 (2007).

Quand?

DFGe < 25 ml/min

DFGe < 20 ml/min

DFGe < 15 ml/min

O'Hare, A. M. et al. When to refer patients with chronic kidney disease for vascular access surgery: Should age be a consideration? *Kidney Int* 71, 555-561 (2007).

Table 4. Points associated with each risk factor in the CKD mortality equation derived in the Cardiovascular Health Study

Risk Factor Categories	Points
Age (yr)	
70–74	0
75–79	1
80–84	2
≥85	4
Sex	
Women	0
Men	1
Race	
Black	0
White	1
eGFR creatinine (ml/min per 1.73 m²)	
50–59	0
40–49	1
30–39	2
<30	4
Urine albumin-to-creatinine ratio ≥30 mg/g	
No	0
Yes	1
Diabetes	
No	0
Yes	1
Smoking	
Never	0
Former	1
Current	2
Prevalent heart failure	
No	0
Yes	2
Prevalent stroke	
No	0
Yes	1

Risque de mortalité à 5 ans

Point Total	Estimate of Risk (%)
0	3.87
1	5.85
2	8.82
3	13.16
4	19.42
5	28.13
6	39.66
7	53.82
8	69.33
9	83.60
≥10	93.70

Bansal N, Katz R, de Boer IH, et al. Development and Validation of a Model to Predict 5-Year Risk of Death without ESRD among Older Adults with CKD. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. 2015;10(3):363-371. doi:10.2215/CJN.04650514.

Figure 1 | Quartiles of life expectancy after dialysis initiation by age group.

Tamura MK, Tan JC, Hare AMOA. Optimizing renal replacement therapy in older adults: a framework for making individualized decisions. 2011;82(3):261-269. doi:10.1038/ki.2011.384.

HD MORTALITY PREDICTOR

Programmed by Stephen Z. Fadem, M.D., FASN and Joseph Fadem

DOWNLOAD IPHONE APP

SERUM ALBUMIN

g/dL

SURPRISE QUESTION

- I would NOT be surprised if my patient died in the next 6 months.
- I would be surprised if my patient died in the next 6 months.

AGE years

DEMENTIA

- My patient HAS dementia.
- My patient does NOT have dementia.

PERIPHERAL VASCULAR DISEASE

- My patient HAS peripheral vascular disease.
- My patient does NOT have peripheral vascular disease.

XBETA: -154.59

Predicted Six Month Survival: 89%

Predicted Twelve Month Survival: 74%

Predicted Eighteen Month Survival: 60%

REFERENCE:Cohen LM, Ruthhazer R, Moss AH, Germain MJ. Predicting Six-Month Mortality for Patients who are on Maintenance Hemodialysis Clin J Am Soc Nephrol. 2009 Dec 3

<http://touchcalc.com/calculators/sq>

Âge - abords - mortalité

Figure 2. Annual mortality rates (95% confidence intervals) by type of vascular access in use and gender (A) and age (B) among 616 participants in the CHOICE Study. * $P < 0.02$ versus fistula.

Mortalité selon type du PREMIER ABORD **CRÉÉ** et âges

N= 74,997

Patients de 67-79 ans

N= 37,149

Patients de 80-89 ans

USRDS; 115,425 pts incident de plus de 67ans. Mortalité de toutes causes selon le premier abord créé.

DeSilva, R. N. et al. Fistula First Is Not Always the Best Strategy for the Elderly. Journal of the American Society of Nephrology 24, 1297–1304 (2013).

Gr = 43 bact/1000 pts-année

Gr = 48 bact/1000 pts-année

KT = 143 bact/1000 pts-année

Table 2 | Number needed to treat with preferred access type to prevent one episode of vascular access–related bacteremia due to non-preferred access

Treatment strategy to prevent bacteremia	Quartiles of life expectancy																	
	65–69 years			70–74 years			75–79 years			80–84 years			85–89 years			≥90 years		
	75th	50th	25th	75th	50th	25th	75th	50th	25th	75th	50th	25th	75th	50th	25th	75th	50th	25th
AVF vs. AVG Model 1	9	17	48	10	20	62	11	25	82	14	33	110	18	47	167	24	67	219
AVF vs. AVG Model 2	27	—	—	35	—	—	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AVG vs. CVC Model 1	<1	1	4	<1	1	5	<1	2	6	1	2	8	1	4	12	2	5	16
AVG vs. CVC Model 3	<1	1	4	<1	2	5	<1	2	7	1	3	9	1	4	15	2	5	21

Abbreviations: AVF, arteriovenous fistula; AVG, arteriovenous graft; CVC, central venous catheter.

‘—’ indicates life expectancy is shorter than time required to achieve benefit from intervention.

Model 1: Assumes both access types are functional at the start of dialysis.

Model 2: Assumes patients with AVF dialyze via CVC for 3 months while AVF matures and that patients with an AVG dialyze for 0.5 months with a CVC until the AVG is ready for use.

Model 3: Assumes patients with AVG dialyze via CVC for 0.5 months until the AVG is ready for use.

Tableau 1 Taux d’incidence des bactériémies et risque relatif selon le type de voie d’accès vasculaire

0,28 / patients-période ou 36 /1000 pts-année

Voie d’accès	Taux d’incidence de bactériémies/100 patients-périodes
Fistule artérioveineuse	0,10 13 /1000 pts-année
Fistule synthétique	0,22 29 /1000 pts-année
Cathéter permanent	0,38 43 /1000 pts-année
Cathéter temporaire	6,20

Tamura MK, Tan JC, Hare AMOA. Optimizing renal replacement therapy in older adults: a framework for making individualized decisions. 2011;82(3):261-269. doi:10.1038/ki.2011.384.

Comité de surveillance provinciale des infections nosocomiales (SPIN) Résultats de surveillance 2013-2014. INSPQ. SPIN Vol 1 No8 2014

RÉSUMÉ

- Quand ?
 - Patient jeune ou patient âgé avec une espérance de vie de plus de 2 ans
 - Cartographie veineuse favorable
 - FAVn 6 à 12 mois avant la date prévue d'IRT
 - Cartographie mauvaise et/ou calcul du risque d'échec de maturation élevé
 - Greffon 6 à 8 sem avant le début de la dialyse
 - Patient avec espérance de vie estimée de < 18 mois à 2 ans (avec espérance de vie en dialyse de < 1 an)
 - Cathéter à considérer (vs greffon)

Registre des abords

- Serait utile pour:
 - Mieux comprendre les obstacles à la création des abords avant le début de la dialyse
 - Mieux évaluer les échecs de maturation et les échecs primaires
 - Mieux évaluer la survie des abords
 -
- De façon à améliorer nos pratiques

CONCLUSIONS

- Le nombre et la proportion de patients dialysés par cathéter sont nettement trop élevés au Canada et au Québec
- Pour réduire ce nombre, il faut intervenir en pré-dialyse surtout mais également en dialyse
- Les patients âgés ou avec plusieurs comorbidités ainsi que les patients indécis demeurent un défi
- Un registre des abords vasculaires permettrait une meilleure compréhension des problématiques